

Giloba[®]

Extracto de Ginkgo Biloba

40 mg

PHYTOSOME[®]

Composición:

Cada cápsula contiene:

Ginkgo Biloba PHYTOSOME [®] ...	115 mg
Equivalente a extracto de Ginkgo Biloba	40 mg
Excipientes	c.s.p 1 cápsula blanda

Uso tradicional: Coadyuvante en el alivio sintomático de los trastornos leves derivados de las alteraciones circulatorias cerebrales (como vértigo y mareos) o de las extremidades inferiores (como calambres y sensación de frío en las piernas), debido a su actividad vasodilatadora cerebral y periférico. Como coadyuvante en la mejora de la microcirculación sanguínea.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a Ginkgo Biloba o a alguno de los componentes de Giloba.

No se recomienda su uso durante el embarazo ni la lactancia.

Interacciones:

Anticoagulantes, antiplaquetarios o trombolíticos: El Ginkgo Biloba se deberá usar con precaución en pacientes tratados con estos medicamentos, ya que puede producir unos efectos antiplaquetarios clínicamente significativos. Ginkgo Biloba puede potenciar el efecto de los antiagregantes plaquetarios.

Otros medicamentos: Ginkgo Biloba puede disminuir la acción de medicamentos como Alprazolam, Diazepam, Fenitoína, Efavirenz.

Alcohol: Potencia la actividad del fármaco. No deben consumirse bebidas alcohólicas durante el tratamiento con este fármaco.

Alimentos: Altas dosis de ginkgo pueden producir presión arterial alta cuando se toman con alimentos que contienen tiramina como el vino y quesos. Algunas hierbas como el clavo de olor, la salvia miltiorrhiza, el ajo, el jengibre, el ginseng Panax y otras pueden aumentar el riesgo de sangrado.

Precauciones:

No se debe administrar más de 8 semanas seguidas, excepto por indicación del médico. Si los síntomas empeoran o persisten después de este período de tiempo, a pesar de la toma regular y dosis suficiente, se debe consultar con el médico, indicándole la dosis y el tiempo que ha tomado este medicamento.

Uso en niños: No se dispone de suficiente experiencia clínica en este grupo de edad. Se han dado casos aislados de convulsiones tónicas-clónicas pérdida de conciencia, no se debe administrar a menores de 18 años.

Embarazo y lactancia:

Como precaución general, y debido a que no se dispone de datos sobre su utilización durante el embarazo y la lactancia, no se recomienda su uso en dichas situaciones salvo mejor criterio médico.

Advertencias y precauciones especiales:

Personas que toman anticoagulantes o aspirina deben consultar al médico antes de usar este producto. Las personas con hemorragia uterina, hemorragia cerebral reciente, gastrointestinal aguda, hipotensión arterial de gravedad e infarto del miocardio en evolución, deben evitar la administración del fármaco en cualquiera de sus presentaciones farmacéuticas.

Diabetes: El ginkgo podría interferir con el tratamiento de diabetes. Si tiene diabetes controle de cerca su azúcar en la sangre.

Convulsiones: Hay preocupación de que el ginkgo podría producir convulsiones. No use ginkgo si alguna vez ha tenido convulsión.

Trastornos de sangrado: El ginkgo podría empeorar los trastornos de sangrado. No use ginkgo si tiene un trastorno de sangrado.

Cirugía: El ginkgo podría retardar la coagulación sanguínea. Podría producir más pérdida de sangre durante y después de una cirugía. Deje de tomar ginkgo por lo menos 2 semanas antes de tener un procedimiento quirúrgico.

Conducción y uso de máquinas: Durante el tratamiento puede producirse disminución de los reflejos y somnolencia, lo que debe ser tenido en cuenta para la conducción de vehículos o el manejo de otra maquinaria.

Reacciones adversas:

Pueden presentarse aunque rara vez trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, o una reacción alérgica en la piel. Si alguno de estos síntomas ocurre, consulte a su médico o farmacéutico.

Tratamiento en caso de sobredosis:

No se conocen casos de sobredosificación con Ginkgo Biloba, sin embargo en caso de que se produzcan, el tratamiento debe ser sintomático.

Advertencias:

- Si los síntomas empeoran o persisten después de 8 semanas de tratamiento continuo y regular a dosis suficiente, se deberá evaluar la situación clínica.
- Para el tratamiento del vértigo la administración durante más de 8 semanas no aporta beneficio terapéutico.
- Debido a insuficiente experiencia clínica, no se recomienda el uso en menores de 18 años.

Dosis y vías de administración:

Oral, se recomienda administrar 1 cápsula tres veces al día (por un periodo de 6-8 semanas) o como lo indique el médico.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a menos de 25º C en lugar seco, protegido de la luz solar directa.

Manufacturado por:

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited

384 Pattana 3 Road,

Bangpoo Industrial Estate,

Samutprakarn 10280, Tailandia.